



# FEDERATION DES SPORTS ET LOISIRS CANINS

4, rue de la Forge  
22450 HENGOAT

[www.fslc-canicross.net](http://www.fslc-canicross.net)

## FEUILLE D'INFO

**FSLC 2020-05-11 A**

EMETTEUR : Commission Vétérinaire

SERVICE :

DESTINATAIRES : Président(e)s, licencié(e)s

### **La vaccination à la suite du confinement**

Vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions quant à la vaccination de vos binômes pendant le confinement. Certains, parmi vous, n'ont pas pu vacciner leurs compagnons en temps et en heure selon les consignes de respect du confinement.

Afin d'assurer la sécurité de tous nos chiens sur les courses tout en collant au plus près à la situation épidémiologique qui nous concerne sur les gros rassemblements de chiens, nous avons pris conseil auprès de 2 spécialistes européens sur le sujet:

- Dr Etienne Thiry: Docteur en médecine vétérinaire, chef du service de virologie vétérinaire et des maladies virales animales à la faculté de médecine vétérinaire de l'université de Liège, résident du collège européen de santé publique vétérinaire.

- Dr Ludovic Freyburger: Docteur en médecine vétérinaire, Maître de Conférences et consultant en médecine préventive à VetAgro Sup, Président du Groupe d'Etude en Médecine Préventive.

Cette note est difficile à vulgariser sans commettre d'erreurs en cas de difficultés d'interprétation nous vous conseillons de la remettre à votre vétérinaire, il sera le plus à même de l'appliquer.

Ainsi,

- le vaccin CHP (carré/ hépatite/parvo) a une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) d'une validité de 3 ans, avec une réponse immunologique satisfaisante dans les 90 jours qui suivent la date de validité après la primovaccination (comprenant minimum les 2 premières injections pour les chiots de moins de 16 semaines ainsi que le rappel 1 an plus tard. Ces 3 premières injections doivent être réalisées selon

AMM). Nous tolérerons donc un vaccin réalisé DANS les 90 jours qui suivent la date de validité si les 3 premières injections ont été réalisées dans les règles.

- le vaccin contre la leptospirose a une AMM de validité de 1 an, avec une réponse immunologique satisfaisante dans les 90 jours qui suivent la date de validité après la primovaccination (comprenant les 2 premières injections ainsi que le rappel 1 an plus tard. Ces 3 premières injections doivent être réalisées selon AMM). Nous tolérerons donc un vaccin réalisé DANS les 90 jours qui suivent la date de validité si les 3 premières injections ont été réalisées dans les règles.

- le vaccin contre la toux de chenil (contenant Pi pour parainfluenza et Bb pour Bordetella bronchiseptica) a une AMM de validité de 1 an, avec une réponse immunologique satisfaisante dans les 30 jours qui suivent la date de validité après la primovaccination pour le pneumodog (comprenant les 2 premières injections ainsi que le rappel 1 an plus tard. Ces 3 premières injections doivent être réalisées selon AMM). Nous tolérerons donc un vaccin réalisé DANS les 30 jours qui suivent la date de validité si les 3 premières injections ont été réalisées dans les règles.

Pour le vaccin muqueux (nobivac kc), il se fait en une seule administration et a une AMM de validité d'un an avec une réponse immunologique encore satisfaisante dans les 30 jours qui suivent dès la première injection. Nous tolérerons donc un vaccin réalisé DANS les 30 jours qui suivent la date de validité. Nous rappelons qu'étant donné l'excrétion virale dans les 6 semaines qui suivent la vaccination, il est recommandé d'administrer le nobivac kc 6 semaines avant une compétition.

Nous attirons votre attention sur le fait que les vaccins ne contenant que Bordetella Bronchiseptica (et pas Para influenza) ne pourront être associés qu'à des vaccins CHPPI renouvelés tous les ans ou au vaccin versican Pi/ L4 (seul existant de ce type à notre connaissance) renouvelé tous les ans pour assurer une protection adéquate. Ils ne seront acceptés que selon ces protocoles.

-le vaccin rage a une validité de 3 ans et pour des raisons légales (notamment sur les compétitions internationales), il n'y aura pas de tolérance. Néanmoins, ce vaccin se faisant en une injection, il sera considéré valide 21 jours après l'injection en cas de dépassement.

La Commission Vétérinaire