

GESTION DE LA TOUX DU CHENIL

LA TOUX DU CHENIL, QU'EST-CE QUE C'EST ?

La toux de chenil ou Trachéo-bronchite infectieuse est une **maladie du chien très contagieuse qui touche les voies respiratoires**. Les 2 agents pathogènes principalement mis en cause sont une bactérie (*Bordetella bronchiseptica*) et un virus (parainfluenza canin) mais ils peuvent être accompagnés d'autres agents viraux ou bactériens

SYMPTÔMES

- Une toux sèche, qui survient souvent par quintes parfois suivie de vomissements s'aggravant à l'effort.
- Un écoulement nasal ou oculaire parfois de la fièvre et une baisse de forme.
- Trachéite/Laryngite avec modification de la voix.
- Attention peut évoluer en forme grave avec atteinte pulmonaire profonde dans certains cas (animal immunodéprimé, jeunes chiens non vaccinés, conditions d'hygiène précaire).

TRANSMISSION

- Principalement par inhalations.
- Contacts truffe à truffe.
- Environnement clos, promiscuité sont des facteurs aggravants.
- Éternuements, aboiements peuvent projeter des gouttelettes de substances contaminées.
- **Temps d'incubation : 3 à 10 jours.**



@hvovet.com

PRÉVENTION

Il existe des vaccins pour protéger contre les 2 agents responsables, voir avec votre vétérinaire traitant pour que votre chien soit à jour.

Le rappel se fait tous les ans !



@zooplus.fr

QUE FAIRE EN CAS DE CONTAMINATION ?

- Isoler le chien de tout contact avec les autres.
- Contacter et informer les chiens avec qui il y a eu contact direct ou indirect.
- Contacter son vétérinaire pour une prise en charge thérapeutique rapide.
- **Isolement minimum 2-3 semaines au sein du club.**

Au sein du club :

- Ne pas accepter de chiens non vaccinés.
- Idéalement arrêt des entraînements des chiens concernés pendant 2 semaines, l'effort aggravant les symptômes.
- Limiter le nombre de chiens présents, le stress étant un facteur aggravant avec des distances de sécurité importantes entre les chiens.
- Eviter gamelles collectives pour l'eau, privilégiez gamelle individuelle.
- Attention au délai post vaccinal car le chien peut être excréteur plusieurs semaines après son vaccin (6-11 semaines).
- Pas de prêt de matériel notamment jouet à prendre en gueule et désinfection en cas de contact.
- Désinfection quotidienne des agrès si présents.
- Se désinfecter les mains entre chaque chien, attention aux chaussures et vêtements.
- Privilégiez lieux bien ventilés et environnements pas trop secs.
- Précautions supplémentaires à prendre avec races brachycéphales « nez écrasés » beaucoup plus sensibles aux pathologies respiratoires.

Bérengère Poletti
Commission vétérinaire